SPOSÓB PODANIA
Fiprex® Duo

Trzymaj pipetę pionowo, stuknij wąską część pipety, tak aby upewnić się, że zawartość pozostaje w głównym korpusie pipety.

Odłam końcówkę.

Rozsuń sierść na grzbiecie zwierzęcia u podstawy szyi przed łopatkami, aż skóra będzie widoczna.

Umieść końcówkę pipety na skórze i ściśnij pipetę kilka razy, aby całkowicie opróżnić jej zawartość bezpośrednio na skórze w jednym miejscu.

Nie należy kąpać zwierzęcia 2 dni po podaniu produktu i częściej niż raz w tygodniu.

Lek może być podawany ciężarnym i karmiącym sukom oraz kotkom.

Produktu nie należy stosować u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni i (lub) ważących mniej niż 2 kg.

Produktu nie należy stosować u kociąt w wieku poniżej 8 tygodni i (lub) ważących mniej niż 1 kg. Nie należy stosować produktu u fretek w wieku poniżej 6 miesięcy.

FIPRex® DUO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: FIPREX® DUO 50 mg + 60 mg roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek. **SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY:** Każda 0,5 ml pipetka zawiera: **Substancje czynne:** Fipronil 50,00 mg, (s)-metopren 60,00 mg, substancje pomocnicze: Butylohydroksyanizol (E320), Butylohydroksytoluen (E321), Etanol 96%, Polisorbat 80, Powidon K 17, Glikolu dietylowego monoetylowy eter. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Roztwór do nakrapiania. Klarowny zielonkawo-żółtawy roztwór. **WSKAZANIA LECZNICZE: U kotów:** Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i (lub) wszołami. Eliminacja pcheł (*Ctenocephalides spp.*). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł trzymuje się przez 4 tygodnie. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 6 tygodni po zabiegu. Eliminacja kleszczy (*Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus*). Działanie roztoczobójcze produktu utrzymuje się do 2 tygodni po podaniu (jak wykazały dane doświadczalne). Eliminacja wszołów (*Felicola subrostratus*). Produkt może być wykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), o ile zostało ono wcześniej rozpoznane przez lekarza weterynarii. **U fretek:** Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami. Eliminacja pcheł (*Ctenocephalides spp.*). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Eliminacja kleszczy (*Ixodes ricinus*). Działanie roztoczobójcze produktu utrzymuje się przez 4 tygodnie po podaniu (jak wykazały dane doświadczalne). **PRZECIWWSKAZANIA:** Ze względu na brak dostępnych danych produktu nie należy stosować u kociąt w wieku poniżej 8 tygodni i (lub) ważących mniej niż 1 kg. Nie należy stosować produktu u fretek w wieku poniżej 6 miesięcy. Nie stosować produktu u zwierząt chorych (cierpiących na choroby układowe, gorączkę) lub u zwierząt w okresie rekonwalescencji. **Nie stosować produktu u królików ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a nawet zgonu.** Ze względu na brak badań, nie zaleca się stosowania produktu u gatunków innych niż docelowe. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. **Wyłącznie dla zwierząt. Leki wydawane bez przepisu lekarza weterynarii (OTC). NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:** 2963/20. **PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:** Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro sp. z o.o. ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin. **Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.**

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: FIPREX® DUO S: 67 mg + 60,3 mg roztwór do nakrapiania dla psów, FIPREX DUO M: 134 mg + 120,6 mg roztwór do nakrapiania dla psów, FIPREX® DUO L: 268 mg + 241,2 mg roztwór do nakrapiania dla psów, FIPREX® DUO XL: 402 mg + 361,8 mg roztwór do nakrapiania dla psów. **SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY:** FIPREX® DUO S - każda 0,67 ml pipetka zawiera: Substancje czynne: Fipronil 67,00 mg, (s)-metopren 60,30 mg, FIPREX® DUO M - każda 1,34 ml pipetka zawiera: Substancje czynne: Fipronil 134,00 mg, (s)-metopren 120,60 mg, FIPREX® DUO L- każda 2,68 ml pipetka zawiera: Substancje czynne: Fipronil 268,00 mg, (s)-metopren 241,20 mg, FIPREX® DUO XL - każda 4,02 ml pipetka zawiera: Substancje czynne: Fipronil 402,00 mg, (s)-metopren 361,80 mg; substancje pomocnicze: Butylohydroksyanizol (E320), Butylohydroksytoluen (E321), Etanol 96%, Polisorbat 80, Powidon K 17, Glikolu dietylowego monoetylowy eter. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Roztwór do nakrapiania. Klarowny zielonkawo-żółtawy roztwór. **WSKAZANIA LECZNICZE:** Produkt jest przeznaczony dla psów o masie: Fiprex® Duo S - od 2 do 10 kg, Fiprex® Duo M -od 10 do 20 kg, Fiprex® Duo L - od 20 do 40 kg , Fiprex® Duo XL - powyżej 40 kg. Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i (lub) wszołami. Leczenie inwazji pcheł (*Ctenocephalides spp.*). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 8 tygodni. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 8 tygodni po zabiegu. Leczenie inwazji kleszczy (*Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus*). Działanie roztoczobójcze produktu utrzymuje się do 4 tygodni po podaniu. Leczenie inwazji wszołów (*Trichodectes canis*). Produkt może być wykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), o ile zostało ono wcześniej rozpoznane przez lekarza weterynarii. **PRZECIWWSKAZANIA:** Ze względu na brak dostępnych danych produktu nie należy stosować u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni i (lub) ważących mniej niż 2 kg. Nie stosować produktu u zwierząt chorych (cierpiących na choroby układowe, gorączkę) lub u zwierząt w okresie rekonwalescencji. **Nie stosować produktu u królików ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a nawet zgonu.** Ze względu na brak badań, nie zaleca się stosowania produktu u gatunków innych niż docelowe. Produkt jest przeznaczony do stosowania u psów. Nie należy go stosować u kotów i fretek ze względu na ryzyko przedawkowania. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. **Wyłącznie dla zwierząt. Leki wydawane bez przepisu lekarza weterynarii (OTC). NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:** FIPREX® Duo S - 2964/20, FIPREX® Duo M - 2965/20, FIPREX® Duo L - 2966/20, FIPREX® Duo XL - 2967/20. **PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:** Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro sp. z o.o. ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin. **Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.**

NOWOŚĆ

FIPRex® DUO

Fipronil + (S)-Metopren

przeciwko pchłom i kleszczom
u psów, kotów i fretek

BEZPIECZNE LEGOWISKO

FIPRex® DUO

zwalcza dojrzałe postaci pcheł, kleszczy u psów, kotów oraz fretek. Dodatkowo eliminuje jaja, larwy i poczwarki przez co redukuje ich ilość w miejscach gdzie zwierzę śpi i odpoczywa m.in. w legowiskach, na dywanach i miękkich tapicerkach.

BEZPIECZNE LEGOWISKO

PODWÓJNA OCHRONA
PRZED PASOŻYTAMI ZEWNĘTRZNYMI

2 substancje czynne

Fipronil
– zwalcza dorosłe postaci pcheł, kleszczy i wszołów

(S)-Metopren
– hamuje rozwój niedojrzałych postaci pcheł - zwalcza jaja, larwy i poczwarki

Fiprex® Duo
działa na wszystkie stadia rozwojowe pchły!

Tylko 5% pcheł znajduje się na zwierzęciu. Pozostałe 95% występuje w jego domu - w postaci jaj, larw i poczwarek. *



Dorosła pchła składa w okresie dwóch tygodni ok. 280 jaj, z których większość spada ze zwierzęcia. Postaci niedojrzałe pcheł (jaja, larwy i poczwarki) gromadzą się wszędzie tam, gdzie pupil odpoczywa - w legowiskach, na dywanach, kanapach. **

(S)-Metopren zawarty w preparacie Fiprex® Duo hamuje rozwój wszystkich postaci rozwojowych pchły, co zmniejsza ryzyko kolejnych zakażeń.

** Flea infestations: epidemiology, treatment and control, The Veterinary Nurse, June 2014*

*** www.esccap.pl/pchly*

Dlaczego ochrona przed pchłami i kleszczami jest tak ważna?

Pchły to jedne z najczęściej spotykanych pasożytów zewnętrznych psów i kotów. Ten bezskrzydły owad w ciągu doby pochłania 20 razy więcej krwi niż sam waży i powoduje ogromny dyskomfort u swojego żywiciela.

Pchły są bardzo uciążliwe dla pupila i stanowią zagrożenie dla jego zdrowia:

- podrażniają skórę zwierzęcia, wywołując silny świąd
- są przyczyną niedokrwistości u zwierząt silnie zarażonych
- ich obecność może być przyczyną atopowego pchlego zapalenia skóry (APZS) czyli silnej reakcji alergicznej, która objawia się występowaniem zmian skórnych
- poprzez przypadkowe połknięcie pchły nasz pupil może się zarazić tasiemcem (pchły są żywicielem pośrednim tasiemca)

Kleszcze to małe pajęczaki, które występują w lasach i na łąkach ale również w miejskich parkach, a nawet przydomowych ogrodach. Wbrew powszechnej opinii kleszcze nie atakują z wysoka ale czyhają na swoją ofiarę po wspięciu się na niewielkie rośliny, np. trawy.

Brak mroźnej zimy sprawia, że pasożyty te są aktywne prawie przez cały rok.

Kleszcze mogą przenosić niebezpieczne choroby, m.in. babeszjozę. Schorzenie to wywołuje pierwotniak z rodzaju *Babesia*, który wnika do krwi wraz ze śliną kleszcza i atakuje czerwone krwinki prowadząc do groźnej dla życia anemii, a nawet do śmierci zwierzęcia. Babeszjoza objawia się osłabieniem, apatią, wysoką gorączką. W przebiegu choroby może wystąpić ostra niewydolność nerek oraz uszkodzenie wątroby.

Chroń swojego pupila!

- **Stosuj Fiprex® Duo przez cały rok!**
- **Jeżeli w gospodarstwie domowym są inne zwierzęta, również powinny być poddane leczeniu preparatem przeciwko pchłom i kleszczom.**
- **Dbaj o miejsca, w których przebywa Twój pupil - regularnie odkurzaj, pierz, stosuj środki owadobójcze.**